

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ: 2810224948, Fax: 2810225616
Email: pkrpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε τον καταναλωτή και το περιβάλλον

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ



Περωνόσπορος. Επιδεκτική βλάστηση για μολύνσεις μέσα σε βάτα πριν από την κανονική έκπτυξη των αμπελιών. (διπλανή καλλιέργεια).

Περωνόσπορος. Κηλίδες λαδιού την ίδια περίοδο σε φύλλα μέσα στα βάτα (δύσκολα αντιληπτές, οι πρώτες εμφανίζονται χαμηλά στο έδαφος).

Ωίδιο. Ασθενικός βλαστός που εκπιτύχθηκε από μολυσμένο οφθαλμό από την περασμένη χρονιά. Αποτελούν την κύρια πηγή των πρωτογενούς μολύσματος.

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής – Εράγγελος Α. Αλατσατιανός

5.

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ: (<i>Plasmopara viticola</i>)	– Υπάρχει στην παραλιακή ζώνη και έχει διαπιστωθεί από 18 Μαρτίου κυρίως σε εγκατελειμμένα αμπελία. Η εξέλιξη του ανεστάλη λόγω των συχνών νοτίων ανέμων και των συνθηκών ανομβρίας που επικράτησαν.
Διαπιστώσεις:	– Οι πρόσφατες βροχές ύψους 2 - 15 χιλ. με μέση θερμοκρασία 10-15° C θα διατηρήσουν την ασθένεια η οποία ήδη “υποβόσκει” σε εστιακές θέσεις. – Η βλάστηση είναι επιδεκτική για μολύνσεις σε όλες τις περιοχές.
Οδηγίες:	<ol style="list-style-type: none">1. Συστηματικός έλεγχος των αμπελιών. Σε αμπελία που διαπιστωθούν συμπτώματα να γίνει άμεση επέμβαση και να ενημερωθούν οι γείτονες αμπελουργοί και οι γεωπόνοι της περιοχής.2. Για την ώρα δεν υπάρχει ανάγκη συστηματικών επεμβάσεων. Σε τυχόν ψεκασμούς να χρησιμοποιούνται σκευάσματα επαφής.

ΩΙΔΙΟ: (<i>Erysiphe necator</i>)	Στις πρώιμες περιοχές έχουν εμφανιστεί τα πρώτα συμπτώματα. Η έγκαιρη αντιμετώπιση είναι καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της ασθένειας.
<i>Οδηγίες:</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Υπενθυμίζεται ότι η αντιμετώπιση του ξεκινά όταν το μήκος της βλάστησης είναι 5 - 6 εκ.2. Σε αμπέλια με βλάστηση μεγαλύτερη από 5 - 6 εκ. που δεν έχει γίνει καμία επέμβαση για ωίδιο να γίνει άμεσα ψεκασμός.3. Επανάληψη ψεκασμού σε αμπέλια που έχουν περάσει δύο εβδομάδες από προηγούμενη επέμβαση για ωίδιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών και ασθενειών του αμπελιού πρέπει να γίνονται με την επιλογή των κατάλληλων φαρμάκων από τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών που σας έχουμε αποστείλλει.

Ηράκλειο 9 Απριλίου 2014

Ο Προϊστάμενος Δ/σης

Τρουλλάκης Γιάννης